

# DB4403

深 圳 市 地 方 标 准

DB4403/T XX—2022  
代替 DB440300/T9—1999

## 龙眼生产技术规程

Code of practice for longan production

(送审稿)

2022-XX-XX 发布

2022-XX-XX 实施

深圳市市场监督管理局 发布



# 目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 主栽品种特点.....	1
5 建园.....	1
6 栽培管理.....	3
7 病虫害综合防治.....	5
8 采收.....	5
9 标志、包装、运输、贮存.....	6
10 生产废弃物管理.....	7
11 果园建档.....	7

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB440300/T9—1999《龙眼生产技术规程》。与DB440300/T9—1999相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 更改了前言（见前言，1999版前言）；
- 更改了范围（见 1，1999版 1）；
- 更改了引用标准（见 2，1999版 2）；
- 删除了部分术语、产量指标、育苗技术规程（见1999版3、4、5、6）；
- 更改了建园的内容（见5，1999版6）
- 更改了栽培管理的内容（见6，1999版7）；
- 删除了主要虫害的防治方法（见1999版附录A）；
- 删除了主要病害的防治方法（见1999版附录B）；
- 更改了病虫害综合防治的内容（见7，1999版8）；
- 更改了采收的内容（见8，1999版9）；
- 删除了果品技术要求（见1999版10）；
- 更改了标志、包装、运输、贮存的内容（见9，1999版11）；
- 增加了生产废弃物管理的内容（见10）；
- 增加了记录管理的内容（见11）；

本文件由深圳市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：深圳市农业科技促进中心、深圳市南山区西丽果场。

本文件主要起草人：阮兆英、张建繁、张军飞、邱金淡、刘小华、黄少珍、袁文静、祁百福、鲁长青、杨泽柳

本文件及其所替代的文件的历次发布情况为：

- 1999年首次发布DB440300/T9—1999；
- 本次为第一次修订。

# 龙眼生产技术规程

## 1 范围

本文件规定了深圳龙眼生产中主栽品种特点、建园、栽培管理、病虫害综合防治、采收、标志、包装、运输、贮存、生产废弃物处理和果园建档等方面的技术要求。

本文件适用于深圳地区龙眼的生产与管理。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
- GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
- GB/T 5737 食品塑料周转箱
- GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
- GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则
- GB/T 8321（所有部分） 农药合理使用准则
- GB/T 17419 含有机质叶面肥料
- GB/T 17420 微量元素叶面肥料
- NY/T 496 肥料合理使用准则 通则
- NY/T 798 复合微生物肥料
- NY/T 1472 龙眼 种苗
- NY/T 1479 龙眼病虫害防治技术规范
- NY/T 5010 无公害农产品 种植业产地环境条件

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**短截** short cut

剪除枝梢一部分。

### 3.2

**疏剪** thin out

将枝梢从基部疏除。

### 3.3

**螺旋环剥** spiral girdlin

依技术要求螺旋状环绕树干或主枝剥皮。

### 3.4

#### 冲梢 abnormal early flowering branches

发育中的龙眼花穗受某种条件的影响长出枝叶，花序发育终止的现象。

## 4 主栽品种特点

### 4.1 石硤

树形高大，树冠多呈自然圆头型，树姿开张，树干粗壮，树冠外枝梢下垂。每复叶具小叶8片~10片，以10片为多，呈阔卵形，色泽浓绿，叶片较厚，有光泽，叶缘略有波浪状。花穗较大，呈圆锥状，花较密生。单果重6g~11g，圆形或扁圆形，果皮黄褐色，有深黄褐色至淡黄色斑纹。

### 4.2 储良

树势中等，树冠半圆头型，开张，树干树皮粗糙，分枝多，节间较短。叶片深绿色，略有光泽，每复叶有小叶6片~8片，中等大，呈长披针形或长椭圆形。花穗中等，花密生。单果重9g~14g，鸡肾形，果皮黄褐色，较平滑，果蒂部无放射纹，果实中部及果顶隐约可见龟状纹。

## 5 建园

### 5.1 园地选择

#### 5.1.1 气候条件

年平均气温 21℃~23℃，一月份平均温度 12℃~15℃，年降雨量 1500mm~1800mm，年日照时数 1800小时~2100小时，平均霜日少于五天。

#### 5.1.2 地形

选阳光充足、排水良好山地、丘陵地或旱地，坡度在 20度以下。

#### 5.1.3 土壤

土壤条件应符合 NY/T 5010 规定的要求。选择土质较疏松肥沃、保水，透气性较好的红壤土、黄壤土、沙壤土、冲积土等微酸性土壤。

#### 5.1.4 水源

龙眼园应具备水源和灌溉条件。灌溉水质应符合 NY/T 5010 规定的要求。

### 5.2 规划开园

#### 5.2.1 划分小区

根据土壤条件、坡度、坡向、结合排灌系统和道路进行划分小区。

#### 5.2.2 道路设置

在园内应留汽车道和机耕道，机耕道设在小区之间，用于小区作业。

#### 5.2.3 修筑梯田

山地、丘陵山地在种植前按等高线修筑水平梯田。

#### 5.2.4 排灌系统

园内设防洪沟、排水沟和灌溉系统。

#### 5.2.5 其它配套设施

根据果园生产规模，建设和完善道路系统、管道灌溉、喷药系统、农资仓库、果品分级包装设备及贮藏库房、工作室及附属设施等。

#### 5.2.6 挖树穴

树穴规格 (m) : L 1 × W 1 × H 0.8 。

#### 5.2.7 放基肥

在挖好的树穴内放足有机肥（农家肥），然后填回表土起墩，堆沤一个月至二个月待种。

#### 5.2.8 品种选择配置

宜根据品种适应性和市场的需求选择适宜品种，同一小区内宜种同一品种。

### 6 栽培管理

#### 6.1 定植

##### 6.1.1 定植时期

春植：4月~6月；秋植：9月~10月。

##### 6.1.2 定植密度

每公顷300棵。根据果园环境、栽培管理水平及机械化操作程度，株行距以 (4m~6m) × (6m~8m) 为宜。

##### 6.1.3 定植方法

选用嫁接苗或圈枝苗，苗木要求应符合NY/T 1472的规定，定植深度与苗期相同，嫁接口不能埋在土里。定植前施足有机基肥，定植后施促根肥，淋足定根水，定植后一、二个月内遇旱应坚持淋水。

#### 6.2 施肥

##### 6.2.1 施肥原则

采用平衡施肥原则。提倡以有机肥、微生物肥为主，化肥为辅，叶面肥为快速补充的配合方式施肥。肥料应符合NY/T 496、NY/T 798、GB/T 17419及GB/T 17420相关要求。在果实采收前15天内应停止使用叶面肥。

##### 6.2.2 施肥方法

视土壤、天气情况、肥料种类和龙眼生长发育需要，可采用穴施、沟施、淋施、撒施和管道灌溉施肥等施肥方法。撒施化肥应避免大雨，宜在雨后进行。

##### 6.2.3 幼树施肥

定植一个月后开始施肥，一梢二肥。第1年株施复合肥1 kg，第2年起比上年增加50%~100%。每年株施有机肥30 kg，石灰2 kg。

#### 6.2.4 结果树施肥

结果树施肥应根据果园土壤肥力状况、果树生产能力和不同发育阶段，在主要物候期合理安排肥料种类及施用量。年施肥量以每生产50 kg鲜果计算。龙眼结果树施肥量参考表1。

表1 龙眼结果树施肥量

施肥时期	生产 50kg 果实的肥料施用量 (kg)				
	花生麸	尿素	氯化钾	复合肥	石灰
促花肥	3~5	0.5~0.8	0.2~0.3	0.5	2.0~2.5
幼果肥	-	0.3~0.5	0.6~0.8	0.6	-
盛果肥	-	0.3~0.5	0.6~0.8	0.6	-
促梢肥	-	0.9~1.1	0.2~0.4	0.4	-
全年	3~5	2.0~2.9	1.6~2.3	2.1	2.0~2.5

#### 6.2.5 根外追肥

在开花前、幼果生长发育期，应重视有效硼和有效镁的施用，施用时间以上午10时前或下午3时后为佳，喷布以叶背为主。常用的肥料种类和浓度：硼酸（砂）0.1%~0.2%，硫酸镁0.1%~0.3%，钼酸铵0.02%~0.1%，磷酸二氢钾0.2%~0.5%，以及国家批准生产的氨基酸、核苷酸等叶面肥。

### 6.3 修剪

#### 6.3.1 幼树整形修剪

采用波浪式“圆头型”树冠。在主干高度约50 cm~60 cm处分生主枝三条至四条，再通过短截，培养二、三、四级粗壮骨干枝，每级分枝长度25 cm~35 cm，形成分布均匀、结果紧凑树冠。

#### 6.3.2 结果树修剪

采用回缩修剪与常规修剪相结合，按以下技术要点进行：

- 采果期修剪，主要疏除树冠中上部直立和过密枝条，控制树冠高度，宜与采果操作同步；
- 采果后修剪，主要为常规修剪，清除交叉枝、过密枝、病虫枝、重叠枝及树冠外围生长不良的枝梢，宜在采果后短期内完成。修剪后枝条分布均匀，阳光透入树冠后，地面出现“金钱眼”为宜；
- 当年无结果的树，于春季进行剪枝；
- 已郁闭封行的果园，选择间伐或中度回缩修剪。间伐采取同行间伐或品字形间伐；中度回缩修剪，在直径8 cm~15 cm的第四级主枝或五级主枝上进行，留基部10 cm~30 cm锯断。
- 弱树不宜修剪，应加强肥水管理恢复树势。

### 6.4 培养秋梢

15年生以下的幼龄结果树，收果后可培养二次秋梢；成年结果树培养一次至二次秋梢（末次秋梢在10月中、下旬萌发）；老年结果树至少培养一次秋梢，作为第二年的结果母枝。每放一次秋梢应施一次肥，每次新梢期间喷施1次~2次农药保梢。配合修剪、施肥、灌水等措施，控制梢量，提高梢质。

## 6.5 控冬梢促花

### 6.5.1 药物控冬梢、促花

可用多效唑或其它已在龙眼上登记的控梢促花药物，按推荐使用浓度，在12月上旬冬梢抽出至刚展叶时喷树冠1次~2次。在1月上旬喷施含钾叶面肥促花。

### 6.5.2 辅助措施

12月中下旬对冬梢进行人工短截，短截时基部留1 cm~2 cm。末次秋梢转绿后，控水控肥。春季如遇极端低温寒潮天气，选用海藻素等含有生物活性物质的叶面肥、配合促花类生长调节药剂促进花芽适时萌发。

## 6.6 预防“冲梢”

### 6.6.1 控梢控穗

春梢抽出2 cm~3 cm时使用多效唑，按推荐使用浓度喷雾。

### 6.6.2 摘除花穗叶片

当龙眼出现冲梢现象时，及时人工摘除花穗上的叶片，每三天至五天一次，直至花穗完整抽出为止。

### 6.6.3 喷药杀小叶

使用已在龙眼上登记的促花药物，按推荐使用浓度，杀花穗小嫩叶。

### 6.6.4 摘除顶芽

当花序已抽出长达10 cm以上，叶腋已出现“蟹眼”，遇气温上升有可能发生花包叶的“冲梢”时，及时摘除顶芽。

## 6.7 保花保果

### 6.7.1 果园放蜂

龙眼开花期间果园放蜜蜂，每亩1箱~2箱。放蜂期间应停止喷施农药。

### 6.7.2 根外追肥

龙眼在整个挂果期间可喷施富含钾元素的氨基酸叶面肥或其他市售保果叶面肥。

### 6.7.3 疏花疏果

#### 6.7.3.1 疏花

疏花时按以下技术要点进行：

- a) 在花穗长约12 cm~18 cm，能识别花穗强弱时进行疏花，剪除过密的弱小花穗；
- b) 弱树多疏、壮树多留；树顶多疏、下层多留；外围多疏、内部多留；侧穗分枝级数多的过长

花穗多疏、短壮花穗多留；

- c) 当花穗过长时，进行短截，保留15 cm~20 cm的花穗；
- d) 疏花量约占花总量的30%~50%，使花穗在树冠上分布均匀。

### 6.7.3.2 疏果

疏果时按以下技术要点进行：

- a) 在果实幼果黄豆大时进行疏果；
- b) 疏果量视树势强弱、结果量多少、品种及管理水平而定，树势强壮、管理水平高的多留，相反则多疏，疏去空果枝、弱果枝、病虫枝等；
- c) 疏剪结果枝的数量，保持树冠上营养枝的比例不少于全部枝梢的30%；
- d) 石硤每穗果枝宜保留≤50个果，储良每穗果枝宜保留≤30个果。

### 6.7.4 辅助措施

龙眼从花蕾刚抽出至花穗完整抽出整个过程，如遇春旱（2月至4月），应及时进行土壤灌水和叶片喷水，防止花穗干枯；雨后及时摇花。

## 6.8 土壤管理

### 6.8.1 间作

幼龄果园内空地可间种豆类、绿肥、蔬菜等矮秆作物。

### 6.8.2 土壤覆盖

春季至秋季期间，保留果园天然良性草，定期刈割，覆盖于树盘；每年修剪的枝叶经粉碎处理成碎屑后用于覆盖树盘，覆盖厚度不超过12 cm。冬季干旱季节，做好防火措施。

### 6.8.3 中耕

宜在秋梢老熟后进行。中耕深度10 cm~20 cm，以树干为中心半径0.6 m内不中耕，半径0.6 m处至树冠滴水线宜浅，滴水线以外宜深。

### 6.8.4 挖穴改土

6.8.4.1 每年结合深施有机肥，在树冠滴水线挖长方形穴3~4个，逐年轮换位置。

6.8.4.2 秋梢老熟后，在树冠滴水线，挖深40 cm~50 cm、长120 cm、宽50 cm左右的深穴，第一年在植株相对方位挖穴1~2个，次年挖穴方位相对错开，分层埋入腐熟有机肥、绿肥、杂草，粗料在下，细料在上。

### 6.8.5 培土

一般在采果后及冬季清园时结合修整梯田和排水沟进行培土。对因水土流失，根群外露，严重影响树势的果园，应在树盘铺盖塘泥、山泥等，覆盖厚度以盖过露根为宜。

### 6.8.6 冬季清园

每年冬季将园内的枯枝、落叶、杂草进行集中堆沤处理。清园后全面撒施生石灰，每 hm<sup>2</sup> 施用量400 kg~800 kg；树体全面喷施胶体硫800倍液。

## 6.9 水分管理

### 6.9.1 水分管理原则

提倡合理灌溉，采用滴灌、喷灌等节水灌溉方法；灌溉用水水质符合NY/T 5010的规定。

### 6.9.2 灌溉

在秋梢萌发期（9月~11月）、花芽形态分化（现“红点”）至抽穗期（2月~3月）和果实生长发育期（5月~6月），对水分较为敏感，应保持果园土壤湿润状态，如遇连续干旱天气，应进行适度灌溉，每7天~10天一次。

### 6.9.3 排涝

在多雨季节如遇较长时间的降雨，应及时做好排涝工作。地势低洼或地下水位较高的果园，雨季前应疏沟清淤，及时排园内积水。

## 7 病虫害综合防治

### 7.1 综合防治原则

7.1.1 预防为主，综合栽培管理技术，压低病虫害源。

7.1.2 以生态控制为中心，重视周期性的气候条件及其它环境因素，保护和助长本地害虫天敌。

7.1.3 对主要害虫开展简易测报，指导化学防治或物理人工防治，把病虫害控制在造成经济损失允许水平以下。

7.1.4 重点加强防治荔枝蒂蛀虫、荔枝椿、尺蛾类害虫、卷叶蛾类、荔枝瘿螨、霜疫霉病、炭疽病等。

### 7.2 农业防治

7.2.1 加强肥水管理，改善果园条件，以提高树体抗病虫能力。

7.2.2 适时合理修剪，剪去过密枝、病虫枝，集中烧毁。

7.2.3 适时培养健壮秋梢，使梢期整齐；控制冬梢，减少越冬病虫害源

### 7.3 生物防治

7.3.1 保护天敌，春季至秋季期间保留果园天然生草，创造有利于天敌繁衍的生态环境。

7.3.2 使用生物农药防治害虫。

7.3.3 在龙眼初花期，有条件的果园宜人工释放平腹小蜂防治荔枝椿。

### 7.4 物理防治

采用黑光灯、频振式杀虫灯等物理装置诱杀鳞翅目、同翅目害虫；采用黄板诱杀荔枝褶粉虱；采用诱粘剂诱杀桔小实蝇。

### 7.5 化学防治

应符合GB 2763和GB/T 8321（所有部分）规定的要求，提倡使用生物农药；宜使用管道喷药或风送式喷雾机进行作业。不应使用未经国家有关部门批准登记和许可生产的农药；主要病虫害的化学防控方法参照NY/T 1479相关规定。

## 8 采收

## 8.1 采收品质

主栽品种采收品质参考表2。

表2 采收品质

品 种	外观品质	可溶性固形物 (%)
石硖	果实圆形或扁圆形，果皮黄褐色，有深黄褐色至淡黄色斑纹。	≥22.0
储良	果实鸡肾形，果皮黄褐色，较平滑，果蒂部无放射纹，果实中部及果顶隐约可见龟状纹。	≥20.0

## 8.2 采收

应在果实正常成熟，表现出该品种固有的品质特性（色泽、香味、风味和口感等）时采收。采收宜选晴天上午露水干后或阴天进行，雨天或中午烈日时不宜采收。采收过程中应避免机械损伤和果实暴晒。采收后4小时内进行果实的挑选、包装和贮运保鲜。有条件的宜采摘后立即进行预冷和冷藏。

## 9 标志、包装、运输、贮存

### 9.1 标志

标签参照GB 7718的规定执行。外包装上标明产品产地、品种名称、产品执行标准、净含量、采摘日期、生产单位或分装单位名称及地址等内容。

### 9.2 包装

#### 9.2.1 选果

包装前应剔除病果、虫果、机械伤果、未成熟果、过熟果、小果、畸形果和杂质等。

#### 9.2.2 包材

包装材料应牢固、洁净、无毒、无异味，可选用符合GB/T 6543规定的纸箱和符合GB/T 5737规定的塑料水果筐或小竹篓等作为外包装；内包装可用符合GB 4806.7规定的聚乙烯塑料膜（袋）。

#### 9.2.3 规格

纸箱、小竹篓包装容量不宜超过5 kg，塑料水果筐不宜超过10 kg。

### 9.3 运输

9.3.1 运输工具应清洁，有防晒、防雨设施。

9.3.2 果品宜用包装箱加冰的方法运输销售。销往外地的果品宜先预冷降温，用包装箱加冰袋包装后，由冷藏车或冷藏集装箱运输。

9.3.3 运输过程不应与有毒、有害、有异味物品混运，且要轻装轻卸，不应重压。

### 9.4 贮存

采果后需短时存放的场地应阴凉、通风、防晒、防雨、无毒、无异味、无污染。待运果品宜放在空调室内。低温贮藏的适宜温度为3℃~5℃。

## 10 生产废弃物管理

对农用投入品的包装废弃物，应及时收集并交回农用品经营者或农用品包装废弃物回收站（点），不应随意丢弃或填埋、焚烧。树体修剪后的植物废弃物、果园落叶、杂草等，按6.8.2规定处理。

## 11 果园建档

11.1 为提供可追溯证据，应在以下阶段建立并保存相关农事活动：

- a) 生产过程，应包含但不限于：
  - 1) 荔枝品种；
  - 2) 种植面积；
  - 3) 日常生产管理记录；
  - 4) 肥料使用记录；
  - 5) 农药使用记录；
  - 6) 产品质量检测记录；
  - 7) 生产环境质量评价记录；
  - 8) 质量管理文件；
  - 9) 果园种植平面图；
  - 10) 合同协议。
- b) 采收；
- c) 包装；
- d) 销售；
- e) 售后。

11.2 所有记录文件应真实、准确、有专人保管，至少保存2年。

---